

Cómo prepararse para su colonoscopia: Instrucciones de preparación con Miralax

Fecha y hora de llegada para el examen: _____

Nota: Las horas de llegada y del procedimiento NO aparecen en el portal del paciente (Patient Gateway). Por favor, use esta hora.

El examen será realizado por el Dr. _____

 Brigham and Women's Faulkner Hospital
Gregory Endoscopy Centre
1153 Centre Street, 1st Floor
Boston, MA 02130

CANCELACIÓN

La programación de procedimientos requiere una coordinación cuidadosa entre el personal, los médicos y el hospital. Para evitar demoras, es importante que usted cumpla con el horario. Si tiene que cambiar o cancelar la cita, llámenos al menos **3 días antes del procedimiento** al (617) 732-7426. Gracias por su ayuda y consideración.

Esta guía le explica cómo prepararse para que le podamos hacer el mejor examen posible del colon. Complete todos los pasos para que se le pueda hacer la colonoscopia el día programado.

Esta guía incluye:

- Lista de las tareas que debe completar antes de programar su procedimiento
- Lista de compras
- Instrucciones de preparación

Lea todas las instrucciones al menos dos semanas antes de su examen.

Puede encontrar estas instrucciones en www.bwfh.org/prep

Términos médicos empleados en esta guía

Algunas palabras de esta guía quizás sean nuevas para usted. Veamos lo que significan.

Colon

Los desechos sólidos de lo que usted come pasan a través del colon. El colon extrae la sal y el agua de los desechos sólidos. Los tumores y otros problemas médicos pueden afectar al colon.

Colonoscopia

Prueba que examina el interior del colon para ver si hay tumores o problemas médicos que impidan que funcione de la manera apropiada.

Laxante

Medicamento que ayuda a evacuar el intestino.

¿Por qué se necesita una limpieza completa del colon?

Los alimentos y los líquidos pueden permanecer mucho tiempo en el cuerpo. Si todavía hay comida en el colon cuando se le hace la colonoscopia, esto puede impedir que el médico vea problemas, por ejemplo, tumores.

El médico puede obtener las mejores imágenes del colon cuando está totalmente vacío.

El médico se puede dar cuenta de inmediato si el colon está vacío. Si no está totalmente vacío, no se le podrá hacer el examen. Usted tendrá que pedir otra cita y deberá repetir los pasos de la preparación.

Información importante de contacto

- Si tiene preguntas para la enfermera sobre el procedimiento o preparación, puede llamar al 617-983-7124 de lunes a viernes (excluyendo los días feriados) de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
- De lunes a viernes después de las 4:30 p. m. o en fines de semana o días feriados, llame al **617-732-7426** y **elija la opción 2**. Antes de llamar, lea la sección sobre preguntas frecuentes (*Frequently Asked Questions, FAQ*) en www.bwfh.org/prep
- Si por algún motivo necesita cambiar la fecha de su examen, llame al **617-732-7426**.
- Si necesita asistencia médica de inmediato, llame al **911** o vaya a la **sala de emergencias** más cercana.

Lo que usted tiene que hacer antes de la colonoscopia

Una semana antes de la colonoscopia

- Actualice su información de registro llamando al 866-489-4056.
- Llame a su compañía de seguros para averiguar si cubre su colonoscopia. Si su compañía de seguros requiere un referimiento, comuníquese con su médico de atención primaria y pídale que lo envíe por fax al 857-282-5652.
- Si tiene estreñimiento o no tiene una evacuación intestinal diaria, llame a la enfermera de endoscopia al **617-983-7124**.
- **Se requiere una prueba de COVID-19 dentro de los 3 días previos a su procedimiento. El equipo de pruebas de COVID-19 le llamará de 4 a 7 días antes de su procedimiento para programar esto en un centro de pruebas de Mass General Brigham.**

Medicamentos

- Si tiene diabetes, consulte con su médico cómo tomar su insulina o sus otros medicamentos para la diabetes el día antes de la colonoscopia y en el día del procedimiento.
- Si toma anticoagulantes (por ejemplo, Coumadin, Plavix, Pradaxa o Lovenox), consulte con su médico si debe dejar de tomarlos antes de la colonoscopia. Si su médico le recomienda que **no** deje de tomar estos medicamentos antes de su examen, llame al **617-983-7124** y dígaselo a nuestra enfermera de endoscopia.
- Deje de tomar suplementos de hierro por la boca 5 días antes de su procedimiento programado. Puede volver a tomarlos después del procedimiento.

Transporte

- Para su seguridad, después del examen usted no puede conducir ni tomar un servicio de transporte solo(a) (por ejemplo, taxi, Uber o Lyft). Sea cual sea el medio de transporte que use, deberá hacer arreglos para que un adulto responsable lo(a) acompañe al salir del Centro de Endoscopia. Si no hace arreglos de transporte adecuados, el procedimiento no se podrá realizar con sedación.
- Tenga presente que Brigham and Women's Gregory Endoscopy Centre cierra a las 5 p. m. Asegúrese de que la persona que lo lleve a su casa esté disponible antes de la hora de cierre.

Qué llevar a la colonoscopia

- Nombre y número de teléfono de la persona que lo(a) llevará a su casa. Una vez que se la llame, esta persona debe estar disponible para recogerlo(a) dentro de los 30 minutos siguientes.
- Identificación con foto
- NO traiga joyas, salvo anillos de boda.

Cuando la colonoscopia termine

- Generalmente, después de llegar, los pacientes pasan de 2 a 4 horas en la Unidad de Endoscopia. Tratamos de empezar todos los exámenes a tiempo, pero en la atención médica a veces ocurren demoras inesperadas.
- Después del procedimiento, no podrá conducir ni beber alcohol durante 12 horas.

Lista de compras para la colonoscopia

Qué comprar en la tienda de comestibles

Ejemplos de líquidos transparentes:



1 caja de caldo de pollo
 (sin fideos ni alimentos sólidos)



1 caja de "Jell-O" (gelatina)
 (que no sea de color rojo)



1 botella de Ginger Ale o de jugo transparente (de cualquier marca)



2 botellas (de 32 onzas cada una) de Gatorade (que no sean de color rojo, se necesitan para la preparación)

Qué comprar en la farmacia

Medicamentos que necesitará:



1 caja de Dulcolax o de pastillas genéricas de bisacodilo



1 frasco de Miralax o de polietilenglicol genérico
8.3 onzas (238 gramos)



1 caja de Gas-X o de píldoras genéricas de simeticona (125 mg o 250 mg)

Instrucciones de preparación con MiraLax para una colonoscopia

Cinco días antes de su examen

- Deje de tomar suplementos de hierro por la boca. Puede volver a tomarlos después del procedimiento.

Tres días antes de su examen

- Consuma una dieta baja en fibra: evite las nueces de árbol, las semillas, el maíz, y las frutas y verduras crudas (sin cocinar).

Un día antes de su examen

- No coma alimentos sólidos durante todo el día.
- Puede beber sólo **líquidos transparentes** como Jell-O, popsicles, caldo, té, café negro y jugo.
- No podrá comer alimentos sólidos hasta **DESPUÉS** de su examen.



El momento en que debe comenzar la preparación intestinal depende de la hora de su colonoscopia. Siga estas instrucciones:

Si el examen se hace entre las 7 y las 11:30 de la mañana

Un día antes del examen, a las 2 p. m.

1. Tome 2 pastillas de Dulcolax (o de bisacodilo de marca genérica) con un vaso lleno de agua.

Un día antes del examen, a las 5 p. m.

1. Mezcle 1 frasco (238 g) de Miralax y 2 botellas de Gatorade (de 32 onzas cada una) en una jarra grande.
2. Beba un vaso de 8 onzas de la mezcla de Gatorade y Miralax cada 15 minutos, hasta terminar LA MITAD (½) del recipiente.
- Esto hará que tenga heces sueltas. Las heces sueltas tal vez no comiencen hasta que complete el paso siguiente de la preparación.
- Siga bebiendo aunque tenga diarrea. Tal vez sienta náuseas, pero siga bebiendo para asegurar que su colon esté limpio.

5 horas antes del examen

1. Tome una pastilla de 250 mg o dos de 125 mg de Gas-X (o de simeticona de marca genérica).
2. Beba vasos de 8 onzas de la segunda mitad de la mezcla de Gatorade y Miralax cada 15 minutos, hasta terminar de tomar todo el recipiente. Debe terminar de beber la mezcla dentro de las 2 horas. **No beba nada, ni siquiera el líquido de la preparación, durante 3 horas antes del examen.**

Si el examen se hace entre las 12 del mediodía y las 4:30 de la tarde

El día del examen, entre las 5 a. m. y las 6 a. m.

1. Tome 2 pastillas de Dulcolax (o de bisacodilo de marca genérica) con un vaso lleno de agua.
2. Tome una pastilla de 250 mg o dos de 125 mg de Gas-X (o de simeticona de marca genérica).
3. Mezcle 1 frasco (238 g) de Miralax y 2 botellas de Gatorade (de 32 onzas cada una) en una jarra grande.
4. Beba un vaso de 8 onzas de la mezcla de Gatorade y Miralax cada 15 minutos, hasta terminar de tomar TODA la mezcla.
- Esto hará que tenga heces sueltas.
- Siga bebiendo aunque tenga diarrea. Tal vez sienta náuseas, pero siga bebiendo para asegurar que el colon esté limpio.
- **No beba nada, ni siquiera el líquido de la preparación, durante 3 horas antes del examen.**



Instrucciones alternativas para los exámenes por la tarde:

Los pacientes que se someten al examen por la tarde pueden seguir las instrucciones para un examen por la mañana, si así lo desean.

Todos los exámenes

3 horas antes del examen

1. A menos que un médico le indique algo diferente, **tome sus medicamentos habituales** con un sorbo pequeño de agua.